

Ясенева смараглова златка

(*Agrilus planipennis* Fairmaire)



Ясенева смараглова златка (*Agrilus planipennis* Fairmaire) – вкрай небезпечний шкідник листяних порід дерев, особливо ясеня. При високому рівні розмноження шкідник заселяє інші породи дерев: горіх, тополлю, осику, клен, березу, вільху, дуб, граб, липу, ліщину. На відміну від більшості інших стовбурових шкідників ясенева смараглова златка здатна нападати на абсолютно здорові дерева. Пошкоджені шкідником дерева зазвичай усихають протягом двох-трьох років.

Літ жуків триває з середини травня до серпня. Самка відкладає яйця в тріщини та на поверхню кори. Личинки харчуються деревиною, з ростом розширюючи свої ходи. Зимують в личинковій камері на останній стадії розвитку. Залялькування відбувається наступної весни в квітні.



Личинкові ходи під корою

Зазвичай жуки нападають на дерева, що стоять відкрито, особливо в парках, на узліссях, але можуть заселяти і дерева у глибині лісу. Пошкоджені дерева мають розріджену крону, уздовж старих ходів з'являються здуття та тріщини, що призводить до їх загибелі.



Пошкоджене дерево

У перший рік заселення діагностувати наявність ясеневої златки доволі важко. Першими ознаками заселення можуть бути «розкльови» кори птахами та наявність личинкових ходів під корою.

Другий рік заселення – характерні D-подібні отвори на стовбурах і гілках з'являються в наступний рік після заселення дерев златкою. Заселені дерева зазвичай мають зріджену крону, дехромоване листя, на гілках і тонких стовбурцях наявні здуття, тріщини та некрози. Розвиваються вторинні пагони вздовж стовбура та в окоренковій частині стовбурів.

Третій рік заселення – крони суттєво зріджені, помітні відмирання багатьох гілок і численні льотні отвори у формі букви D на стовбурі та гілках.



D-подібні льотні отвори

Розпорядженням Київської міської військової адміністрації від 10.10.2023 року № 790 у зв'язку з виявленням ясеневої златки запроваджено карантинний режим на території Солом'янського Ландшафтного парку на площі 27.12 га

Швидке знищення та обмеження розповсюдження златки допоможуть заходи по своєчасній санітарній вирубці заселених дерев восени або взимку з наступним їх спалюванням. Приваблення в насадження і охорона комахоїдних птахів, особливо дятлів, які знищують личинки і лялечки. Обмеження посадок дерев ясену. Створення оптимально зімкнутих посадок з інших порід дерев для збереження паркових зон та лісосмуг.